

ОСТОРОЖНО ГРИПП ПТИЦ!

Грипп – острая инфекционная **опасная** болезнь, передаваемая человеку от животных и птицы, возбудителем которой является вирус гриппа типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, свиньи, лошади, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.

Основным источником вируса гриппа в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и помётом. Заражение домашней птицы и человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мёртвой дикой или домашней птицей.

Выделение заражённых птиц, попадая на растения, в воздух, могут заразить здоровую птицу и человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным путём и через грязные руки.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной, а также протекать в молниеносной форме, вызывает быструю гибель птицы без каких-либо предварительных симптомов. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движения, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетённое состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность серёжек, отёчность в области головы и шеи. **Гибель** птицы наступает через 24-72 часа после заражения.

Профилактика

Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах.

Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.

Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при **наличии ветеринарных сопроводительных документов**.

Проводить тщательную **очистку и дезинфекцию** всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнёзда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашёной известью.

Обеспечить **засечивание окон и дверей**, исключая возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.

Хранить корма для домашней птицы в ёмкостях, недопустимых для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц (летней период) не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.

Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории необходимо в выделенной для этого рабочей одежде. Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить.

Вся рабочая одежда должна подвергаться дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды кальцинированной) и последующей стирки.

При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на улице, в личных хозяйствах граждан сообщить в государственную ветеринарную службу района.